

DECIZIE nr. 10 din 16 octombrie 2007 privind conținutul minim al trusei de urgență pentru cabinetul de medicină dentară

În temeiul art. 500 și 502 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul național al Colegiului Medicilor Dentiști din România decide:

Art. 1

(1) În vederea asigurării calității actului medico-dentar, la nivelul fiecărui cabinet de medicină dentară se va asigura o trusă de urgență.

(2) Conținutul minim al trusei de urgență este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Colegiului Medicilor Dentiști din România,
Liviu Zetu

ANEXĂ : CONȚINUTUL MINIM al trusei de urgență pentru cabinetul de medicină dentară**1. Aparatură și materiale****a) Obligatorii**

1.	Tensiometru	1 buc.
2.	Stetoscop	1 buc.
3.	Garou	1 buc.
4.	Feșe	3 role
5.	Bandă adezivă	2 role
6.	Soluție polividon-iodat ¹ sau clorhexidină ² pentru tegumente	1 flacon
7.	Perfuzoare pentru soluții cristaline	2 buc.
8.	Canule intravenoase 20 G	2 buc.
9.	Seringi 5 ml sterile	5 buc.
10.	Seringi 10 ml sterile	5 buc.

1 BETADINE, IODINA, IODOSEPT, POLIODINE.

2 HIBISCRUB, HIBITANE, CLORHEXIN, DESMANOL.

b) Facultative

1.	Butelie de oxigen cu reductor de presiune și sistem de administrare (canulă nazală sau mască)	1 buc.
2.	Balon de resuscitare (autogonflabil) cu mască	1 buc.
3.	Pipă oro-faringiană	2 buc. (nr. 3,4)

2. Medicamente

Nr.	DCI ³	Forma farmaceutică	Cantitatea	Observații
1.	Nitroglicerina ⁴ sau Nitroglicerina ⁵	Cp 0,5 mg sau Cp 0,65 mg	1 flacon (40 cp)	1 cp sublingual în criza de angină pectorală, infarct miocardic acut, edem pulmonar acut cu TAS > 100 mm Hg Se poate repeta la 5 min. (3-4 capsule). Atenție la valabilitate! (6 luni)
		Aerosol 0,4 mg/doză	1 flacon (10 g)	2 pufuri sublingual în loc de 1 cp de Nitroglicerina
2.	Enalapril ⁶	Tablete 10 mg	10 buc.	1 comprimat sublingual, pentru scăderea TA
3.	Acid acetilsalicilic ⁷	Capsule 500 mg	10 buc.	1/2 cp mestecat în cazul suspiciunii de infarct miocardic acut
4.	Furosemid ⁸	Fiole 20 mg/2 ml	10 buc.	IV, pentru reducerea TA
5.	Adrenalină	Fiole 1 mg/1 ml	5 buc.	Indicată în cazul șocului anafilactic cu iminență de stop cardiac. Se folosește numai soluție diluată cu ser fiziologic (1 fiolă în 10 ml). Se injectează câte 3 ml SC sau intralingual la 5 min. până la obținerea unei TAS > 90 mm Hg. Calea IV se va folosi numai în situații extreme sau în condițiile monitorizării ECG (se folosesc aceleași doze).
6.	Hidrocortizon Hemisuccinat ⁹	Flacoane 100 mg, fiole 25 mg	2 g (20 x 100 mg sau 80 x 25 mg)	Se administrează IV rapid (bolus) în cazul reacțiilor alergice acute, al crizei astmatice sau al crizei Addisoniene.
7.	Clemastinum ¹⁰ sau Prometazina ¹¹	Fiole 2 mg/1 ml	10 buc.	IM sau IV lent în cazul reacțiilor alergice
		Fiole 50 mg/2 ml	10 buc.	IM în cazul reacțiilor alergice Nu se injectează IV.
8.	Cimetidină ¹² sau Ranitidină ¹³	Fiole 200 mg/2 ml	5 buc.	1 fiolă IV lent asociată antihistaminicelor H1 (Clemastinum, Prometazina) și Hidrocortizonului în cazul reacțiilor alergice grave
		Fiole 50 mg/2 ml	5 buc.	
9.	Clorură de sodiu 90/00	Fiole 10 ml	5 buc.	Ca solvent
10.	Clorură de sodiu 90/00	Pungi 500 ml	2 buc.	Se administrează IV.

Decizia 10/2007 - forma sintetica pentru data 2015-10-07

	Gluczoza 10%	Pungi 500 ml	1 buc.	Se administrează IV în cazul hipoglicemiilor severe sau dacă alimentația orală este imposibilă.
11.	Ketorolac ¹⁴	Cp 30 mg	5 buc.	Oral
12.	Drotavertin ¹⁵	Cp 40 mg	10 buc.	Oral, în caz de dureri colicative
13.	Amoxicilină ¹⁶	Cp 500 mg	5 buc.	2 g PO pentru profilaxia infecțiilor locale și a endocarditei bacteriene
14.	Clindamicină ¹⁷	Cp 150 mg sau 300 mg	4 buc.	600 mg PO pentru profilaxia infecțiilor orale și a endocarditei bacteriene

3 Denumire chimică internațională (denumirile comerciale, dacă sunt diferite de DCI, vor fi listate în subsol, cu majuscule).

4 NITROGLICERINA.

5 MAYCOR NITRO SPRAY, NITROMINT.

6 ENAP.

7 ASPIRINĂ.

8 FURORESE, LASIX.

9 FLEBOCORTID, HIDROCORTIZONE, HIDROCORTIZONE NATRIU SUCCINAT.

10 TAVEGYL.

11 ROMERGAN.

12 HISTODIL.

13 ZANTAC.

14 KETOROL, KETRODOL, TORADOL.

15 NO-SPA.

16 DUOMOX, E-MOX, EPHAMOX, MOXILEN, OSPAMOX.

17 DALACIN C, CLINDAMICIN, KLINDAN, LANACINE.

▶(la data 17-iul-2012 anexa 1 modificat de anexa 1 din Decizia 55/2012)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 864 din data de 18 decembrie 2007